

LE CHAMOIS



CLASSE	ORDRE	FAMILLE	GENRE	ESPÈCE	NOM SCIENTIFIQUE
Mammifères	Artiodactyles	Bovidés	<i>Rupicapra</i>	<i>rupicapra</i>	<i>Rupicapra rupicapra</i>



Taille (au garrot) : 75 à 80 cm
Poids : 35 à 50 kg (mâle) - 25 à 38 kg (femelle)

Morphologie

Le chamois possède deux cornes en forme de crochets qu'il conserve toute l'année. Son corps est marron. Sa queue et deux bandes sous les yeux sont plus sombres. Son chanfrein, la gorge et l'intérieur des oreilles sont plus clairs. Grâce à son pelage, il est capable de supporter de fortes variations de température. Il possède un pied adapté à la course sur des sols accidentés (pierriers, zones rocheuses, pentes fortes, ...).

Habitat

Le chamois est communément observé en altitude, c'est une espèce montagnarde mais pas exclusivement. Les observations en Bourgogne montrent qu'il peut s'installer à basse altitude si toutefois il y trouve du relief, des escarpements rocheux et des massifs boisés (il a été observé entre 170 et 560 m). Il peut vivre toute une année sur une étendue de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines d'hectares. Il emprunte pour se déplacer en Bourgogne des corridors écologiques arborés.

Période de reproduction

La période de rut du chamois débute mi-octobre et court jusqu'en décembre. La femelle met bas d'un chevreau au bout de 23 à 24 semaines de gestation. Les naissances ont lieu de la mi-mai à la mi-juin. La femelle allaite son jeune durant deux mois, ensuite celui-ci mange comme sa mère.

Robert Maxson

Régime alimentaire

Le chamois est un herbivore. Il se nourrit principalement de plantes herbacées, de graminées et de légumineuses et plus rarement de végétaux ligneux.



Ludovic Jouve



Répartition géographique

Quelques individus sont observés en Bourgogne en Saône-et-Loire (depuis 1986) ainsi qu'en Côte-d'Or (depuis 1995). Ces observations sont dans les deux cas situées à l'ouest de la Saône et en particulier sur la côte chalonnaise, la côte beaujolaise, la côte mâconnaise, le Couchois et en plaine de Saône sur la région dijonnaise. Quasiement tous ces individus proviennent du massif jurassien. Les individus présents en Bourgogne appartiennent à la sous-espèce de chamois communément appelée «le Chamois des Alpes».

Réseau trophique

Les prédateurs du chamois sont l'Aigle royal, le Renard roux, le chien errant. Mais les pertes dues à ces prédateurs sont en général très faibles et ne portent que sur les jeunes individus. Le chamois est doué de rapidité dans sa fuite et d'agilité, ce qui le rend difficile à attraper. Le lynx et le loup sont également des prédateurs du chamois.

Relation avec l'Homme

L'Homme exerce une influence indirecte sur le chamois en intervenant sur son milieu de vie : l'exploitation forestière, l'agriculture, le pastoralisme, le tourisme (fréquentation humaine élevée) et une influence directe par le biais de la chasse. Les dérangements répétés peuvent modifier le rythme de ses activités journalières et sa distribution spatiale.